

БЕШЕНСТВО

– смертельно опасное инфекционное заболевание животных и человека

Вирус бешенства поражает мозг человека, попадает в кровь через слюну больного животного при укусах



Проявление заболевания у животных

Вирус БЕШЕНСТВА появляется в слюне заражённого животного за 7-10 дней до появления у него признаков болезни, поэтому человек может заболеть от укуса внешне здорового животного.

В начале заболевания животное прячется, избегает людей, либо ластится, пытается лизнуть.

В разгар болезни больные животные чаще всего возбуждены, бросаются на окружающих, хватают предметы, стремятся сорваться с привязи. У них обильно выделяется слюна.

Болезнь развивается стремительно.

В последней стадии животное не двигается, погибает в состоянии комы.

Первые признаки болезни у человека

- Всегда начинаются с места укуса: возникает зуд, тянущие боли.
- Появляется общая слабость, головная боль, чувство тревоги, тоски, страха смерти.
- Затем появляются симптомы поражения мозга (водобоязнь, светобоязнь).
- В дальнейшем один только вид жидкости, шум воды, резкое движение, яркий свет приводит к приступу, сопровождающемуся спазмом глотки, судорогами мышц.
- Если больной не погибает в период возбуждения, то **смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца.**
- Эффективного лечения от бешенства при развитии картины болезни нет.

Основные переносчики инфекции:



Дикие животные – лисы, волки, енотовидная собака, ежи, летучие мыши



Домашние животные – в основном собаки и кошки

Помните!

Что делать при укусе?



- В течение 10 минут интенсивно промыть место укуса струёй мыльной воды
- Края раны обработать 70% спиртом или настойкой йода
- Обратиться в ближайший травмпункт, пройти курс прививок антирабической вакциной или иммуноглобулина не позднее 14 дня после укуса

Курс прививок в полном объеме и своевременно проведенный имеет эффект!

Прививайте домашних кошек и собак против бешенства!

Не бросайте своих кошек и собак. Если они Вам не нужны, обратитесь к ветеринару!

Избегайте контакта с дикими животными, именно они поддерживают очаг инфекции в природе.

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ БЕШЕНСТВА



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ

При заражении вирус перемещается к мозгу,
в результате возникает энцефалопатия

Без лечения **100%** случаев заканчивается
летальным исходом

Ежегодно от бешенства погибает более 6000 человек

Основные источники инфекции



Грызуны
белки, хомяки



Летучие
мыши



Дикие звери
лисы, волки,
ежи, еноты



Безнадзорные
животные

Как происходит заражение

- ▲ при укусе
- ▲ при ослонении больным (бешеным) животным поврежденных кожных покровов и слизистых оболочек

От человека к человеку вирус не передается

Что делать при укусе

1

Очистить рану, промыть тщательно с мылом и водой.

2

Незамедлительно обратиться в лечебное учреждение за помощью.

3

О покусавшем животном сообщить в государственное ветеринарное учреждение

Профилактика бешенства

- ▲ Прививайте своих домашних питомцев от бешенства
- ▲ Не допускайте контакта домашних животных с безнадзорными
- ▲ Проходите предварительную иммунизацию, если собираетесь в путешествие или на отдых в дикой природе
- ▲ Остерегайтесь диких животных

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!



БЕШЕНСТВО – одно из самых особо опасных заболеваний диких, домашних, сельскохозяйственных животных и человека с признаками поражения центральной нервной системы, всегда с летальным исходом

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА

ДИКИЕ животные



Дикие плотоядные теряют страх перед людьми, проявляют излишнее дружелюбие, но при этом норовят напасть на животных и людей.

ДОМАШНИЕ животные



У собак и кошек наблюдается смена агрессии и ласки, извращение аппетита, усиление полового инстинкта, судороги, обильное слюнотечение.

ЗАРАЖЕНИЕ и СИМПТОМЫ

Заражение происходит через слюну больных животных:

• при укусах •

- через ссадины, царапины, ослюнение кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта и носа •
- при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной •
- при снятии шкуры и разделывании туш диких животных •

После попадания в организм первичная репликация вируса происходит в мышечных клетках на месте проникновения, вызывая боль, зуд и покраснение. Далее он движется по нервным волокнам к спинному и головному мозгу. Вначале вызывает раздражение нервных клеток с проявлением агрессии, возбуждения и беспокойства, а затем - их воспаление, обуславливающие параличи. Вирус распространяется и в другие ткани: слюнные железы, миокард, кору надпочечников, роговицу, скелетные мышцы, что сопровождается обильным слюнотечением, водобоязнью, светобоязнью. Далее наступает общий паралич и смерть.



Что делать при укусе?



1 Интенсивно промыть рану, место укуса теплой водой с мылом



2 Незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение



3 О покусавшем животном сразу же сообщить в государственное ветеринарное учреждение

Вылечить нельзя, предупредить можно!

Своевременная и регулярная вакцинация животных – единственная профилактическая мера борьбы с бешенством